

# Mathematikaufgaben

## > Algebra

## > Bruchgleichungen

**Aufgabe:** Bestimme Definitions- und Lösungsmenge der Bruchgleichung:

$$\frac{4}{x+2} + 5 = \frac{7}{x+10}.$$

**Lösung:** I. Allgemein gilt für das Lösen von Bruchgleichungen, also von Gleichungen z.B. mit der Variablen  $x$ , die Brüche enthalten, die folgende Vorgehensweise:

1) Bestimmung des Hauptnenners aus den Nennern der Einzelbrüche der Bruchgleichung [Der Hauptnenner ist das kleinste gemeinsame Vielfache der in den Nennern der Einzelbrüche vorhandenen Faktoren. Die Nenner der Einzelbrüche sind also in Faktoren zu zerlegen, der Hauptnenner wird als Produkt aus allen Faktoren gebildet, wobei gleiche Faktoren verschiedener Nenner der Einzelbrüche nur einmal zum Hauptnenner beitragen.], 2) Bestimmung der Definitionsmenge aus dem Hauptnenner [Nullsetzen des Hauptnenners ergibt die  $x$ -Werte, die aus der Definitionsmenge ausgeschlossen werden müssen.], 3) Multiplikation der Bruchgleichung mit dem Hauptnenner und Kürzen der einzelnen Brüche [Dabei sind Bruchgleichungen mit dem Hauptnenner zu multiplizieren, so dass: a) jeder Summand in der Gleichung mit dem Hauptnenner multipliziert wird, b) im Falle eines Bruchs als Summand Hauptnenner und Nenner des Bruchs zu kürzen sind.], 4) Ausmultiplizieren der mit dem Hauptnenner malgenommenen und gekürzten Terme [Summen, Differenzen beachten], 5) Sortieren nach  $x^2$ ,  $x$  und einfachen Zahlen, 6) Auflösen der so erhaltenen quadratischen Gleichung nach  $x$ , 7) Probe zum Abgleich von Lösungsmenge und Definitionsmenge.

II. Für das Lösen von quadratischen Gleichungen gilt die b-c-Formel, d.h.:

$$x^2 + bx + c = 0 \Leftrightarrow x_{1,2} = -\frac{b}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 - c}.$$

III. Wir gehen wie folgt vor: a) Der *Hauptnenner* ist das Produkt der in der Gleichung vorkommenden Nenner:  $x+2$ ,  $x+10$ , also:  $(x+2)(x+10)$ .

b) Für die *Bestimmung der Definitionsmenge* der Bruchgleichung gilt: Der Hauptnenner ist 0 bei:  $(x+2)(x+10) = 0 \Leftrightarrow x+2 = 0$ ,  $x+10 = 0 \Leftrightarrow x=-2$ ,  $x=-10$ .

Die gefundenen  $x$ -Werte sind also auszuschließen, so dass hinsichtlich der gesuchten Definitionsmenge:  $D = \mathbf{R} \setminus \{-10; -2\}$  gilt.

c) Bei der *Bestimmung der Lösungsmenge* der Bruchgleichung multiplizieren wir mit dem Hauptnenner und gehen mittels Gleichungsumformungen wie folgt vor:

$$\frac{4}{x+2} + 5 = \frac{7}{x+10} \quad | \cdot (x+2)(x+10) \text{ (Hauptnennermultiplik.)}$$

$$\frac{4}{x+2} (x+2)(x+10) + 5(x+2)(x+10) = \frac{7}{x+10} (x+2)(x+10) \quad \text{(Kürzen)}$$

$$4(x+10) + 5(x+2)(x+10) = 7(x+2) \quad \text{(Ausmultiplizieren)}$$

$$4x + 40 + 5(x^2 + 10x + 2x + 20) = 7x + 14 \quad \text{(Zusammenfassen)}$$

$$4x + 40 + 5(x^2 + 12x + 20) = 7x + 14$$

(Ausmultiplizieren)

$$4x + 40 + 5x^2 + 60x + 100 = 7x + 14$$

(Zusammenfassen)

$$5x^2 + 64x + 140 = 7x + 14$$

| -14

$$5x^2 + 64x + 126 = 7x$$

| -7x

$$5x^2 + 57x + 126 = 0$$

| :5

$$x^2 + 11,4x + 25,2 = 0$$

(b-c-Formel: b=11,4, c=25,2)

$$x_{1,2} = -\frac{11,4}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{11,4}{2}\right)^2 - 25,2} = -5,7 \pm \sqrt{5,7^2 - 25,2} = -5,7 \pm \sqrt{7,29} = -5,7 \pm 2,7$$

$$x_1 = -5,7 - 2,7 = -8,4, \quad x_2 = -5,7 + 2,7 = -3$$

(Lösungen)

Die Zahlen  $x = -8,4$  und  $x = -3$  sind die Lösungen der Bruchgleichung, da sie laut Definitionsmenge  $D = \mathbb{R} \setminus \{-10; -2\}$  nicht ausgeschlossen wurden. Also gilt für die Lösungsmenge:  $L = \{-8,4; -3\}$ .

www.michael-buhlmann.de / 02.2021 / Aufgabe 1295