

# Mathematikaufgaben

## > Folgen, Reihen

### > Explizite Folge

**Aufgabe:** Untersuche die Folge:

$$a_n = \frac{2n^2 + 11}{3n^2 + 4}$$

auf Beschränktheit.

**1. Lösung:** I. Wir definieren: a) Eine Folge  $\{a_n\}$  heißt nach unten beschränkt, wenn es eine untere Schranke  $S_u \in \mathbf{R}$  gibt mit:

$$a_n \geq S_u \text{ für alle } n \in \mathbf{N}.$$

b) Eine Folge  $\{a_n\}$  heißt nach oben beschränkt, wenn es eine obere Schranke  $S_o \in \mathbf{R}$  gibt mit:

$$a_n \leq S_o \text{ für alle } n \in \mathbf{N}.$$

c) Eine Folge  $\{a_n\}$  heißt beschränkt, wenn  $\{a_n\}$  nach oben und nach unten beschränkt ist, d.h.: es gibt eine untere Schranke  $S_u \in \mathbf{R}$  und eine obere Schranke  $S_o \in \mathbf{R}$  mit:

$$S_u \leq a_n \leq S_o \text{ für alle } n \in \mathbf{N}.$$

II. Bei den nachfolgenden Beweisen zu den Beschränktheitseigenschaften der Folge sind immer Ungleichungen auf allgemeingültige Aussagen durch Äquivalenzumformungen zurückzuführen.

Wir haben für die Folge  $a_n = \frac{2n^2 + 11}{3n^2 + 4}$  mit den Folgengliedern:  $a_1 = \frac{13}{7}$ ,  $a_2 = \frac{19}{16}$ ,  $a_3 = \frac{27}{31}$ ,

$a_4 = \frac{43}{52}$ , ... die nachstehenden Behauptungen und Beweise:

1) Behauptung:  $a_n$  hat als eine untere Schranke  $S_u = 0$ .

Beweis:  $a_n \geq S_u$  (für alle  $n \in \mathbf{N}$ )  
 $\frac{2n^2 + 11}{3n^2 + 4} \geq 0$  |  $\cdot (3n^2 + 4) (> 0)$   
 $2n^2 + 11 \geq 0$  |  $-11$   
 $n^2 \geq -11$  wahre Aussage für alle natürlichen Zahlen

2) Behauptung:  $a_n$  hat als eine obere Schranke  $S_o = 2$ .

Beweis:  $a_n \leq S_o$  (für alle  $n \in \mathbf{N}$ )  
 $\frac{2n^2 + 11}{3n^2 + 4} \leq 2$  |  $\cdot (3n^2 + 4) (> 0)$   
 $2n^2 + 11 \leq 2(3n^2 + 4)$   
 $2n^2 + 11 \leq 6n^2 + 8$  |  $-2n^2, -8$   
 $3 \leq 4n^2$  wahre Aussage für alle natürlichen Zahlen

3) Aus der Beschränktheit der Folge nach unten und oben folgt die Beschränktheit insgesamt.

**2. Lösung:** I. Hier gehen wir wie folgt vor: Hat eine Folge einen Grenzwert, so ist sie auch beschränkt. Es ist also im Falle der Konvergenz der Folge der Grenzwert zu ermitteln. Dabei ist wahr: Ist eine Folge ein Bruch mit Zähler und Nenner als Summen von Potenzen, so gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r \cdot p_1(n) + \dots}{s \cdot p_2(n) + \dots} = \begin{cases} \pm \infty & p_1(n) > p_2(n) \\ r/s & p_1(n) = p_2(n) \\ 0 & p_1(n) < p_2(n) \end{cases}$$

Die Potenzen  $p_1(n)$  und  $p_2(n)$  sind dabei u.a. vom Typ  $n^k$ ,  $k \in \mathbf{R}$ .

II. Für den Zähler  $Z(n) = 2n^2 + 11$  der Folge  $a_n$  ist der Ausdruck  $2n^2$  die höchste Potenz, für den Nenner  $N(n) = 3n^2 + 4$  der Term  $3n^2$  der Ausdruck mit der höchsten Potenz. Beide höchste Potenzen sind gleich, die Koeffizienten vor den Potenzen sind  $r=2$  und  $s=3$ , als Grenzwert ergibt sich

also die Zahl  $r/s$ , mithin gilt:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{2}{3}$ . Damit ist die Folge  $a_n = \frac{2n^2 + 11}{3n^2 + 4}$  auch beschränkt.