

Mathematikaufgaben

> Algebra

> Lineare Ungleichungen

Aufgabe: Löse die folgende lineare Ungleichung:

$$-2x + 12 < 0.$$

Lösung: I. Allgemein gilt für das Lösen von linearen Ungleichungen, also von Ungleichungen z.B. mit der Variablen x , die folgende Vorgehensweise: Lineare Ungleichungen sind Ungleichungen mit der Variablen x , die der Form

$$ax + b < / \leq / \geq / > cx + d \quad (*)$$

mit rationalen Zahlen a, b, c, d genügen. Die Lösungen der linearen Ungleichung $(*)$ sind dann zu berechnen vermöge:

$$x < / \leq / \geq / > \frac{d-b}{a-c} \quad (a > c) \text{ bzw. } x > / \geq / \leq / < \frac{d-b}{a-c} \quad (a < c).$$

Um die Lösungen einer linearen Ungleichung der Form $(*)$ zu erlangen, sind eventuell zuvor Term- und Ungleichungsumformungen durchzuführen, die die Terme der Ungleichung u.a. durch das Auflösen von Klammern, durch Addition/Subtraktion von Summanden und Multiplikation/Division von Faktoren betreffen; bei Multiplikation/Division der Ungleichung mit negativen Faktoren wechselt die Ungleichungsrelation von " $<$ " auf " $>$ ", von " $\leq$ " auf " $\geq$ ", von " $\geq$ " auf " $\leq$ ", von " $>$ " auf " $<$ "; die obigen Formeln führen auf die Lösungen der Ungleichung.


II. Wir gehen hinsichtlich der Term- und Ungleichungsumformungen wie folgt vor:

$$\begin{array}{ll} -2x + 12 < 0 & | -12 \\ -2x < -12 & | : (-2) \\ x > 6 & \end{array}$$

-> Lösungsmenge $L = \{x > 6 \mid x \in \mathbb{Q}\}$

Damit ist die lineare Ungleichung gelöst; zur Lösung gehören alle rationalen Zahlen x mit: $x > 6$.

III. Die Lösungsmenge lässt sich noch als Intervall $(6; +\infty)$ wie folgt auf dem rationalen Zahlenstrahl darstellen:



($<$ = kleiner, $\leq$ = kleiner gleich, $\geq$ = größer gleich, $>$ = größer, $\in$ = Element von, $\mathbb{Q}$ = Menge der rationalen Zahlen)